

# Marvel (MDMA)

Vorsicht

hochdosierte XTC's

Zürich (mobil)

13.08.2022

## Substanzendetails

MDMA*HCl	MDEA*HCl
137.8 mg	0.4 mg

## Angaben zur getesteten Substanz

Dicke	Länge x Breite	Gewicht
5.5 mm	7.2 x 8.2 mm	527.8 mg

Farbe	Bruchrille
Orange	Ja

## Relevante Substanz(en)

MDMA	MDA - MDEA - MBDB
------	-------------------



## Risikoeinschätzung

Bei dieser Tablette wurde nebst **MDMA**, wenig **MDEA** und eine **unbekannte Syntheseverunreinigung (ca. 0.2 mg)** nachgewiesen. Aus diesem Grund geht man beim Konsum dieser Tablette ein zusätzliches, unbekanntes Gesundheitsrisiko ein.

MDEA ist ein synthetisches Amphetaminderivat, welches von der chemischen Struktur her ähnlich wie MDMA ist. MDEA wirkt jedoch weniger "magisch" und ist eher berauschender als MDMA. Der empathogene Effekt ist weniger ausgeprägt und in höheren Dosen können halluzinogene Zustände eintreten. Die kleine Menge an MDEA, welche in dieser Pille detektiert wurde, wird bei einem möglichen Konsum kaum bis gar nicht wahrgenommen.

Syntheseverunreinigungen deuten auf eine unsachgemässe Herstellung hin. Zu Risiken, Nebenwirkungen, Langzeitfolgen und Toxizität von Syntheseverunreinigungen sind keine gesicherten Informationen vorhanden. Gänzlich unbekannt ist das Wechselwirkungspotential der Verunreinigungen mit MDMA.

Über 1.5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer und 1.3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen ist zu viel (Bsp. Frau 60kg x 1.3 = max. 78mg MDMA). Nebenwirkungen wie „Kiefer mahlen“, Augen- und Nervenzucken, bis hin zu Krampfanfällen können auftreten. Bei Überdosierungen steigt die Körpertemperatur stärker an und es können Halluzinationen auftreten. An Folgetagen, nach der Einnahme solch hoher Dosen MDMA, treten vermehrt Depressionen,

Konzentrationschwächen, Schlafstörungen und Appetitlosigkeit auf. Die regelmässige Einnahme grosser Mengen MDMA ist neurotoxisch und vergrössert die Wahrscheinlichkeit irreparabler Hirnschäden.

# Warnstufe

 Information

 Vorsicht

 Warnung

## Safer Use

### Testen

Lasse deine Substanzen in einem Drug Checking testen

### Antesten

Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste zuerst maximal einen drittel der Pille an, da sehr viele hochdosierte Tabletten im Umlauf sind.

### Abwarten

Warte nach der Einnahme 2 Stunden, da immer wieder auch Tabletten mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.

### Trinken

Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (3 dl / Stunde) und mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft, um einer Überhitzung / Dehydration vorzubeugen.

### Akzeptieren

Akzeptiere, wenn die Wirkung zu Ende geht, denn «Nachspicken» erhöht die Toxizität (Giftigkeit) von MDMA.

#### Disclaimer

Besitzt du eine Substanz, welche nicht auf dieser Seite erscheint, bedeutet dies keinesfalls, dass sie den erwarteten Inhaltsstoff enthält oder unbedenklich sein sollte. Die von uns veröffentlichten Warnungen beziehen sich nur auf die in unseren Drug Checking Angeboten abgegeben Substanzen, diese Substanzen stellen ein hohes Konsumrisiko dar und sollten nicht konsumiert werden. Eine Substanz kann das gleiche optische Erscheinungsbild haben (Form, Grösse, Farbe etc.) und trotzdem andere Inhaltsstoffe oder eine andere Zusammensetzung aufweisen. Es gibt keinen Drogenkonsum ohne Risiko! Risikofrei ist nur ein vollständiger Verzicht auf Drogen! Wenn du dich dennoch entscheidest, Drogen zu konsumieren, solltest du zumindest die Safer-Use-Regeln befolgen.

**safer  
party  
.ch**